

Arteninventar

Bewertungsschema

WSt. C: nur eine Art der Liste, die auch Kennart ist, WSt. B wird nicht erreicht.

WSt. B: Typische Zusammensetzung d. Moosschicht mit meistens 1 - 2 Kennarten (#).

WSt. A: WSt. B erreicht. Zusätzlich: Arten der Liste ≥ 3 oder $\# \geq 2$

Kennarten

+: Verteilung in der Fläche (3-stufig); R: Einzelexemplar oder auf <5% der Fläche;

T: nur in Teilbereichen <50% der Fläche; **V:** auf überwiegender Fläche vorhanden

[illegible]**Vegetationseinheit** / Pflanzengesellschaft (Assoz. / Verband / ggf. Ordn. / aus Auswahlliste ankreuzen)

mindestens eine KE-spezifische Vegetationseinheit ist obligatorisch, zusätzliche möglich

V Cratoneurion commutati	A Cardamino-Cratoneuretum commutati
A Cratoneuretum filicino-commutati	A Pinguiculo-Cratoneuretum filicini
A Eucladietum verticillati	A Pellio-Cratoneuretum filicini
A Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati	B Cratoneurion commutati-Basalgesellschaft
Zusätzliche:	
Nutzung (Angabe fakultativ)	

Synonyme: (Eingabe möglichst gemäß gültiger Roter Liste Hessens, Synonym verwenden, wenn Art gemäß RL nicht in Eingabesoftware verfügbar)

RL Hessen (2013)

Synonyme

Campylium stellatum var. *protensum*

Campylium protensum

Cratoneuron commutatum

Palustriella commutata

Cratoneuron commutatum var. *commutatum*

Palustriella commutata var. *commutata*

Cratoneuron commutatum var. *falcatum*

Palustriella falcata

Cratoneuron decipiens

Palustriella decipiens